

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian, maka didapatkan suatu kesimpulan mengenai faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian Hernia Inguinalis di Rumah Sakit IPI Medan tahun 2021. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian berdasarkan pekerjaan responden mayoritas memiliki pekerjaan sebagai buruh sebanyak 64 orang (78 %), sedangkan minoritas responden memiliki pekerjaan sebagai pegawai swasta sebanyak 3 orang (4 %).
2. Hasil penelitian berdasarkan riwayat batuk kronik mayoritas responden tidak mempunyai riwayat batuk kronik sebanyak 71 orang (87%), sedangkan minoritas responden mempunyai riwayat batuk kronik sebanyak 11 orang (13%)
3. Hasil penelitian berdasarkan Obesitas mayoritas responden mengalami obesitas sebanyak 43 orang (52%) dan minoritas responden tidak Obesitas sebanyak 39 orang (48%).
4. Hasil penelitian berdasarkan Usia mayoritas responden berusia 56-65 tahun sebanyak 62 orang (76%) dan minoritas responden berusia >70 tahun sebanyak 4 orang (4%).
5. Berdasarkan hasil analisa secara statistik dengan uji chi square dengan nilai P value <0,05 (Pekerjaan: 0,046 , Riwayat batuk kronik: 0,012, Obesitas:

0,021, Usia: 0,025) dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara pekerjaan, riwayat batuk kronis, obesitas dan usia dengan kejadian Hernia Inguinalis.

5.2. Saran

5.2.1 Bagi Rumah Sakit

Diharapkan untuk kedepannya dapat lebih meningkatkan dan memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal serta edukasi yang baik bagi pasien-pasien yang berobat ke RSUD IPI Medan khususnya pasien Hernia Inguinalis guna mencegah terjadinya komplikasi dan untuk bagian data rekam mediknya lebih memperlengkap data rekam medik pasien dari setiap hasil anamnesis baik itu data pribadi maupun riwayat pendukung lainnya dan disimpan dengan baik dan rapi sehingga untuk peneliti yang akan datang bisa mendapatkan informasi dan data yang lebih akurat untuk dijadikan bahan penelitian.

5.2.2. Bagi peneliti selanjutnya

Sebagai penelitian awal, untuk penelitian selanjutnya yang bersifat analitik. Dan juga diharapkan agar menggunakan sampel dari lokasi penelitian lain sehingga dapat dibandingkan antara hasil penelitian di tempat satu dan lainnya. Apabila ingin menggunakan lokasi yang sama diharapkan menggunakan sampel dengan tahun yang berbeda guna melihat perbandingan jumlah pasien hernia inguinalis dari tahun ke tahun dan juga menambah variabel yang diteliti serta mengembangkan metode penelitian untuk mengetahui lebih banyak lagi faktor-faktor resiko yang dapat menimbulkan Hernia Inguinalis sehingga lebih bervariasi.