

ABSTRAK

Stroke merupakan kondisi neurologis yang dapat menyebabkan gangguan fungsi kognitif. Risiko gangguan kognitif pasca stroke semakin tinggi pada individu yang mengalami stroke berbulang. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor risiko utama yang berkontribusi terhadap gangguan fungsi kognitif pada pasien pasca stroke berbulang. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, lokasi penelitian dilakukan di Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia Medan. Waktu penelitian dari awal penyusunan proposal hingga selesai dari bulan Maret 2024 hingga bulan Agustus 2024. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam pada partisipan dan dianalisa. Hasil dari penelitian ini terdiri dari 4 tema yaitu : 1. (Berpengaruhnya usia pada gangguan fungsi kognitif pasca stroke berbulang). 2. (Antara pria dan wanita siapakah yang paling berpotensi mengalami gangguan fungsi kognitif pasca stroke berbulang). 3. (Kebiasaan sehari-hari pasien sebelum mengalami gangguan fungsi kognitif pasca stroke berbulang). 4. (Apakah ada riwayat penyakit lain yang dapat menyebabkan gangguan fungsi kognitif pasca stroke berbulang). Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 1. Usia berpengaruh pada gangguan fungsi kognitif pasca stroke berbulang. 2. Jenis kelamin perempuan lebih berisiko mengalami gangguan fungsi kognitif daripada laki-laki. 3. Aktivitas sangat berpengaruh pada gangguan fungsi kognitif pasca stroke berbulang. 4. Ketidaktahuan partisipan mengenai penyakit gangguan fungsi kognitif pasca stroke berbulang.

Kata kunci : Usia lanjut, Jenis kelamin, Riwayat hipertensi, Aktivitas.