

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia pada pasien Diabetes Melitus Tipe 2, dapat disimpulkan:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa golongan antidiabetik oral yang paling banyak digunakan pada pasien Diabetes Melitus Tipe 2 di Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia adalah golongan sulfonilurea (62,5%), dikarenakan golongan sulfonilurea memiliki 4 jenis obat (glimepirid, gliclazid, glibenclamid, gilpizid).
2. Antidiabetik oral golongan biguanida (37,5%), dikarenakan golongan biguanida hanya memiliki 1 jenis obat (metformin).
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasien yang menggunakan antidiabetik oral golongan biguanida berdasarkan jenis kelamin adalah laki-laki (20%), dan perempuan (80%).
4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasien yang menggunakan antidiabetik oral golongan sulfonilurea berdasarkan jenis kelamin adalah laki-laki (36,0%), dan perempuan (64,0%).

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan diperlukan pengetahuan lebih lanjut serta melakukan penelitian yang lebih spesifik dalam meneliti variable lainnya mengenai pola penggunaan antidiabetik oral pada pasien Diabetes Melitus di Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia sehingga peneliti selanjutnya dapat membandingkan hasil yang diperoleh pada penelitian ini.