

FAKTOR-FAKTOR RSIKO TERHADAP KEJADIAN PREEKLAMPSI PADA IBU HAMIL DI RSU. IMELDA PEKERJA INDONESIA TAHUN 2023

Indri lestari¹

Indri lestari¹

¹Program studi SI Kebidanan, Universitas Imelda Medan

²Lestariindri130801@gmail.com

ABSTRAK

Latar Belakang : Preeklampsia adalah penyakit kehamilan yang spesifik pada manusia, didefinisikan sebagai kondisi hipertensi dan proteinuria setelah usia kehamilan 20 minggu. **Tujuan :** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor risiko terhadap kejadian preklampsia di RSU.Imelda Pekerja Indonesia Medan. **Metode :** Desain penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah observasional analitik dengan rancangan *Cross sectional*. *Cross sectional* adalah rancangan penelitian yang menganalisis hubungan antara Faktor-faktor sebab dan akibat dengan berbagai pendekatan seperti observasi atau pengumpulan data dalam satu waktu. **Hasil :** Dari hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh signifikan pada variabel umur ($P=0.029$), Antenatal Care ($P=0.000$), Paparan asap rokok ($P=0.018$), riwayat penyakit ($P=0.001$), Dan pola makan ($P=0.003$). **Kesimpulan :** Dalam penelitian ini bahwa ada pengaruh dari Umur,ANC, Riwayat hipertensi, Paparan Asap rokok dan pola makan Terhadap risiko Kejadian Preeklampsia **Saran :** Yang disampaikan dihadapkan khususnya bagi petugas kesehatan agar memberikan penyuluhan terus-menerus untuk memberikan penyuluhan melakukan deteksi dini dengan melakukan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan haemoglobin dan pemeriksaan protein urine dan untuk petugas kesehatan di Rumah sakit tingkatkan kemampuan penanganan preeklampsia

Kata kunci : Preeklampsia, Ibu hamil, Faktor Risiko

Daftar pustaka : (2018-2022)

RISK FACTORS ON THE INCIDENCE OF PREECLAMPS IN PREGNANT WOMEN AT RSU. IMELDA INDONESIAN WORKER IN 2023

Indri lestari ¹

¹ Midwifery SI study program , Imelda University Medan

² Lestariindri130801@gmail.com

ABSTRACT

Background Back : Preeclampsia is disease specific pregnancy _ on human , defined as condition hypertension and proteinuria after age 20 weeks pregnant .

Goal : Objective study This is For know factors risk to incident preclampsia at RSU.Imelda Medan Indonesian Workers .

Method : Design study This is study quantitative . Method research used _ is observational analytic with design *Cross sectional* . *Cross-sectional* is design research that analyzes connection between factors because And active with various approach like observation or deep data collection One time .

Result : : From the results study show there is influence significant on variable age ($P=0.029$), Antenatal Care ($P=0.000$), Exposure to cigarette smoke ($P=0.018$), history disease ($P=0.001$), and pattern eat $P=(0.003)$

Conclusion : In study This that There is influence from Age, AN C , History hypertension , exposure to cigarette smoke And pattern Eat Against risk Incident Preeclampsia

Suggestion: What was conveyed faced specifically for officer health to provide counseling continously For give counseling do detection early with do inspection support like hemoglobin examination and urine protein examination and For officer Health at Home Sick upgrade ability handling preeclampsia

Keywords : Preeclampsia , Mother _ pregnant , Factor Risk

List library : (2018-2022)