

ABSTRAK

Tingginya angka kematian ibu atau AKI di Indonesia merupakan masalah penting yang perlu ditangani secara serius. AKI adalah ukuran keberhasilan kesehatan ibu dan merupakan barometer layanan kesehatan di suatu negara, jika masih tinggi, itu berarti bahwa layanan kesehatan dikategorikan tidak baik (Adriansz, 2007). Jadi salah satu upaya yang perlu diperhatikan adalah meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan wanita dan ibu terutama melalui pemeriksaan kehamilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi persepsi ibu tentang tanda bahaya masa nifas di klinik haji hanum tahun 2006. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif peneliti berusaha memahami sebuah peristiwa dalam keadaan, peneliti melakukan studi terhadap budaya kelompok dalam kondisi yang alamiah berbagai aspek subjektif serta perilaku manusia yang dilakukan di klinik Hj. Hanum kota medan pada bulan juli sampai agustus 2024 yang dimulai dari pengumpulan data dan pelaksanaan penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu peneliti sendiri, catatan lapangan, panduan wawancara, dan alat perekam. Hasil penelitian ini didasarkan pada masa nifas adalah akhir dari periode persalinan dengan ditandai lahirnya selaput dan plasenta yang akan berlangsung selama 6 minggu, di tarik kesimpulan bahwasannya masa nifas merupakan masa sesudah persalinan hingga pulihnya alat alat reproduksi seperti semula yang proses pemulihannya berlangsung sekitar 6 minggu dan kurang lebih 40 hari. Berdasarkan hasil penelitian ini menyatakan bahwa dari 5 informan tidak pernah melakukan kunjungan pada masa nifas. Cakupan pelayanan nifas adalah pelayanan kepada ibu dan neonatal mulai dari 6 jam sampai dengan 42 hari pasca persalinan sesuai standar oleh tenaga kesehatan. Periode kunjungan nifas yang sesuai dengan standar adalah KF1 yakni 6 jam sampai hari ke 2 pasca persalinan, KF2 yakni hari ke 3 sampai hari ke 7 pasca persalinan, KF3 yakni hari ke 8 sampai hari ke 28 pasca persalinan dan KF4 yakni hari 29 sampai hari ke 42 pasca persalinan. Berdasarkan wawancara diatas dari 5 ibu hanya 2 ibu yang mengetahui tanda bahaya masa nifas dan yang diketahuinya hanya terjadi perdarahan.

Kata Kunci :Persepsi, Bahaya masa nifas, Wanita hamil.

ABSTRACT

The high maternal mortality rate or MMR in Indonesia is an important problem that needs to be addressed seriously. MMR is a measure of maternal health success and is a barometer of health services in a country. If it is still high, it means that health services are categorized as not good (Adriansz, 2007). So one effort that needs to be considered is improving the quality of women's and maternal health services, especially through pregnancy checks. The purpose of this research is to explore mothers' perceptions about the danger signs of the postpartum period at the Haj Hanum clinic in 2006. This research is a descriptive qualitative research, the researcher tries to understand an event in a situation, the researcher conducts a study of group culture in natural conditions, various subjective aspects and human behavior. which was carried out at the Hj. Hanum clinic, Medan city from July to August 2024, starting from data collection and research implementation. The research instruments used were the researcher himself, field notes, interview guides, and recording equipment. The results of this research were based on the postpartum period. the end of the labor period marked by the birth of the membranes and placenta which will last for 6 weeks, it is concluded that the postpartum period is the period after childbirth until the recovery of the reproductive organs to their original state, the recovery process lasts around 6 weeks and approximately 40 days. Based on the results of research This states that 5 of the informants never visited during the postpartum period. The scope of postpartum services is services to mothers and neonates from 6 hours to 42 days after delivery according to standards by health workers. Postpartum visit periods that are in accordance with the standards are KF1, namely 6 hours to day 2 after delivery, KF2, namely day 3 to day 7 after delivery, KF3, namely day 8 to day 28 after delivery, and KF4, namely day 29 to day 2. 42 postpartum. Based on the interviews above, of the 5 mothers, only 2 mothers knew the danger signs during the postpartum period and all they knew was bleeding.

Keywords: *Perception, Dangers of the postpartum period, Pregnant women.*